

Notkun lyfja á Íslandi

1989-1999



Rit heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins
April 2000
Eggert Sigfússon

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Efnisyfirlit:

| | bls. |
|---|-------------|
| Formáli | 3 |
| ATC-flokkunarkerfi | 4 |
| Notkun lyfja-aðalflokkar –DDD/1000 íbúa/dag | 5 |
| Lyfjasala- aðalflokkar- | 7 |
| 10 mest notuð lyf | 9 |
| 10 söluhæstu lyf | 11 |
| Lyfjasölu raðað eftir skráningarári | 13 |
| Sundurlðun eftir greiðslumerkingu almannatrygginga - 1999 | 15 |
| Sundurliðun eftir afgreiðslumerkingu - 1999 | 16 |
| Sundurliðun í heildsöluverð og smásöluverð 1996-1999 | 17 |
| Meltingarfæra- og efnaskiptalyf | 18 |
| Blóðlyf | 22 |
| Hjarta- og æðasjúkdómalyf | 24 |
| Húðlyf | 28 |
| Pvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar | 31 |
| Hormónalyf, önnur en kynhormónar | 35 |
| Sýkingalyf | 37 |
| Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmisbælingar eða ónæmistemprunar | 39 |
| Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf | 41 |
| Tauga- og geðlyf | 44 |
| Sníklalyf | 48 |
| Öndunarfæralyf | 50 |
| Augn- og eyrnalyf | 52 |
| Ýmis lyf | 54 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Formáli.

Ráðuneytið birtir nú út í fyrsta sinn á vefsíðu sinni yfirlit um notkun lyfja á Íslandi og tekur það til áranna 1989-1999. Síðasta útgáfa af sambærilegum upplýsingum kom út í prentuðu formi í október 1997 og náði yfir tímabilið 1990-1996.

Í þessu riti sem hinum fyrri er stuðst við ATC og DDD flokkunarkerfi. ATC er skammstöfun fyrir Anatomical Therapeutical Chemical classification system og eru aðalflokkar þess sýndir á bls. 3. Aðalflokkar greinast síðan í undirflokká í 4 þrepum.

Pannig hefur t.d. lyfið ómeprazól ATC-flokkun **A-02-B-C-01**, sem greinist þannig.

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| A | meltingarfæra- og efnaskiptalyf, |
| A02, | sýrubindandi lyf, |
| A02B, | lyf við sársjúkdómi, |
| A02BC, | prótónpumpublokkarar |
| A02BC01, | ómeprazól |

DDD er skammstöfun fyrir **Defined Daily Dose**, skilgreindur dagskammtur, og eru skammtarnir skilgreindir sem viðhaldsskammtur lyfs við helstu ábendingu fyrir notkun þess. Dagskammtölur sem notaðar eru í þessu riti eru skv. skilgreiningu WHO í janúar 2000. Þeim sem vilja leita nánari skýringa á hugtökunum ATC og DDD er bent á rit Norrænu lyfjanefndarinnar (NLN) *Nordic Statistics on Medicines* (NLN Publications No 2,3,8,9,10,14,15,16,21,30,34 og 43) og enn fremur *Guidelines for ATC classifications* og *Guidelines for DDD* (sameiginlegar útgáfur WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology í Oslo og Norrænu lyfjanefndarinnar).

Nokkrar breytingar verða á ATC-flokkunarkerfinu á hverju ári og eru allar tölur í skýrslunni endurreiknaðar aftur í tímann skv. nýjustu skilgreiningu.

Magnþölur sem útreikningarnir byggjast á eru fengnar úr IDM Icelandic Drug Market Statistik, sem gefið var út ársfjórðungslega af Dansk Lægemiddelstatistik og grundvallast á sölutöllum frá lyfjaheildsöllum. Síðan 1996 hefur þetta rit verið gefið út af Samtökum Verslunarinnar.

Söluverðmæti er reiknað á apóteksverði með virðisaukaskatti, þ.e. selt magn ársins * verð skv. lyfjaverðskrá í lok hvers árs.

Meginefni ritsins eru töflur, línu- og súlurit um notkun lyfja í mismunandi ATC-flokkum, sýndar í dagskömmum á 1000 íbúa á dag (DDD/1000íbúa/dag) og verðmæti í mkr.

ATC flokkunarkerfi

- A Meltingarfæra-og efnaskiptalyf
(Alimentary tract and metabolism)
- B Blóðlyf
(Blood and blood forming organs)
- C Hjarta-og æðasjúkdómalyf
(Cardiovascular system)
- D Húðlyf
(Dermatologicals)
- G Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar
(Genitourinary system and sex hormones)
- H Hormónalyf, önnur en kynhormón
(Systemic hormonal preparations excluding sex hormones)
- J Sýkingalyf
(General antiinfectives, systemic)
- L Æxlishemjandi lyf
(Antineoplastic and immunomodulating agents)
- M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf
(Musculo-skeletal system)
- N Tauga- og geðlyf
(Central nervous system)
- P Sníklalyf
(Antiparasitica)
- R Öndunarfæralyf
(Respiratory system)
- S Augn-og eyrnalyf
(Sensory organs)
- V Ýmis lyf
(Various)

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999


Notkun lyfja í skilgreindum dagskömmum - Aðalflokkar

DDD/1000 íbúa/dag

| | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Meltingarfæra-og efnaskiptalyf (Alimentary tract and metabolism) | 148,89 | 147,05 | 136,44 | 125,80 | 116,73 | 111,02 | 105,28 | 107,62 | 106,91 | 108,57 | 111,45 |
| B Blóðlyf (Blood and blood forming organs) | 18,42 | 19,27 | 18,55 | 21,52 | 22,80 | 23,13 | 25,19 | 26,20 | 25,69 | 26,22 | 25,72 |
| C Hjarta-og æðasjúkdómalýf (Cardiovascular system) | 147,50 | 149,22 | 140,82 | 158,68 | 150,77 | 158,74 | 169,48 | 177,11 | 184,61 | 200,92 | 213,90 |
| D Húðlyf (Dermatologicals) | 1,77 | 1,87 | 1,70 | 1,72 | 2,08 | 2,70 | 2,86 | 3,00 | 3,54 | 3,49 | 3,89 |
| G Þvagfæralyf, kvensjúkdómalýf og kynhormónar (Genitourinary system and sex hormones) | 72,44 | 76,90 | 77,19 | 85,02 | 89,42 | 96,37 | 105,10 | 109,30 | 115,90 | 121,66 | 127,75 |
| H Hormónalyf, önnur en kynhormón (Systemic hormonal preparations excluding sex hormones) | 16,36 | 17,62 | 17,35 | 18,61 | 18,04 | 19,55 | 20,68 | 21,70 | 23,56 | 25,30 | 30,55 |
| J Sýkingalyf (General antiinfectives, systemic) | 22,89 | 23,81 | 22,43 | 22,63 | 21,82 | 21,92 | 21,42 | 22,58 | 21,93 | 22,93 | 21,45 |
| L Æxilshemjandi lyf (Antineoplastic and immunomodulating agents) | 1,15 | 1,57 | 1,50 | 1,61 | 1,64 | 1,77 | 2,02 | 2,15 | 2,43 | 2,75 | 3,18 |
| M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf (Musculo-skeletal system) | 32,96 | 35,96 | 31,97 | 35,08 | 34,25 | 35,18 | 38,56 | 42,73 | 43,87 | 47,64 | 50,99 |
| N Tauga- og geðlyf (Central nervous system) | 128,61 | 125,73 | 126,58 | 138,75 | 139,32 | 148,37 | 164,76 | 177,68 | 193,05 | 208,07 | 225,53 |
| P Sníklalyf (Antiparasitica) | 1,32 | 1,15 | 1,22 | 1,33 | 1,42 | 1,40 | 1,41 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| R Öndunarfæralyf (Respiratory system) | 60,94 | 67,10 | 70,30 | 74,06 | 68,97 | 74,66 | 81,58 | 87,29 | 88,53 | 91,67 | 94,29 |
| S Augn- og eyrnalyf (Sensory organs) | 11,27 | 10,46 | 9,07 | 9,68 | 9,85 | 9,75 | 9,75 | 10,02 | 10,26 | 10,28 | 9,09 |
| V Ýmis lyf (Various) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Samtals DDD/1000 íbúa/dag | 664,54 | 677,71 | 655,10 | 694,48 | 677,13 | 704,57 | 748,11 | 788,87 | 821,77 | 871,01 | 919,41 |
| Breyting | | 2,0% | -3,3% | 6,0% | -2,5% | 4,1% | 6,2% | 5,4% | 4,2% | 6,0% | 5,6% |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Lyfjanotkun 1989-1999



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999


Lyfjasala - Aðalflokkar

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A Meltingarfæra-og efnaskiptalyf (Alimentary tract and metabolism) | 691,4 | 761,8 | 778,0 | 781,6 | 737,5 | 722,5 | 766,4 | 760,6 | 812,8 | 924,0 | 1042,7 |
| B Blóðlyf (Blood and blood forming organs) | 162,4 | 204,1 | 206,2 | 232,2 | 243,5 | 269,7 | 258,6 | 293,5 | 296,1 | 423,4 | 507,4 |
| C Hjarta-og aðasjúkdómalyf (Cardiovascular system) | 656,0 | 692,7 | 673,2 | 751,1 | 690,3 | 744,1 | 775,1 | 798,5 | 855,5 | 989,5 | 1089,4 |
| D Húðlyf (Dermatologicals) | 195,9 | 216,0 | 226,1 | 263,8 | 310,7 | 363,0 | 372,2 | 372,3 | 380,2 | 393,1 | 394,7 |
| G Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar (Genitourinary system and sex hormones) | 190,0 | 219,3 | 226,4 | 275,2 | 320,8 | 406,4 | 476,7 | 528,7 | 560,0 | 610,5 | 689,4 |
| H Hormónalyf, önnur en kynhormón (Systemic hormonal preparations excluding sex hormones) | 74,0 | 80,1 | 88,0 | 107,4 | 108,8 | 119,4 | 131,2 | 136,5 | 135,7 | 151,7 | 178,3 |
| J Sýkingalyf (General antiinfectives, systemic) | 543,7 | 616,0 | 558,9 | 532,7 | 580,3 | 615,1 | 547,4 | 623,1 | 640,8 | 709,5 | 738,3 |
| L Æxilshemjandi lyf (Antineoplastic and immunomodulating agents) | 95,8 | 122,0 | 129,0 | 144,2 | 162,5 | 206,3 | 218,9 | 204,8 | 222,6 | 283,4 | 404,2 |
| M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf (Musculo-skeletal system) | 244,9 | 259,9 | 222,7 | 239,3 | 228,6 | 243,0 | 253,0 | 292,2 | 307,6 | 355,3 | 404,3 |
| N Tauga- og geðlyf (Central nervous system) | 640,3 | 715,6 | 792,9 | 993,4 | 1065,0 | 1264,8 | 1463,3 | 1646,3 | 1871,2 | 2227,2 | 2510,3 |
| P Sníklalyf (Antiparasitica) | 15,8 | 18,2 | 18,3 | 19,8 | 21,4 | 25,4 | 28,4 | 33,8 | 34,1 | 38,0 | 38,4 |
| R Öndunarfæralyf (Respiratory system) | 301,7 | 345,3 | 392,9 | 424,4 | 425,3 | 514,9 | 605,8 | 699,1 | 757,1 | 803,2 | 869,3 |
| S Augn-og eyrnalyf (Sensory organs) | 87,8 | 107,2 | 112,6 | 114,4 | 126,9 | 134,3 | 140,8 | 162,9 | 164,2 | 173,2 | 167,4 |
| V Ýmis lyf (Various) | 105,0 | 124,3 | 129,3 | 142,4 | 165,8 | 181,8 | 174,1 | 167,7 | 176,2 | 180,9 | 161,4 |
| Samtals mkr | 4004,7 | 4482,6 | 4554,7 | 5022,0 | 5187,3 | 5810,6 | 6211,8 | 6720,1 | 7214,2 | 8262,9 | 9195,5 |
| Breyting | | 11,9% | 1,6% | 10,3% | 3,3% | 12,0% | 6,9% | 8,2% | 7,4% | 14,5% | 11,3% |


Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Sala lyfja 1989-1999




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

10 mest notuð lyf á Íslandi 1999 og notkunarþróun þeirra frá 1989




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

10 mest notuð lyf á Íslandi 1999 og notkunarþróun þeirra frá 1989




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

10 söluhæstu lyf 1999 og söluþróun þeirra frá 1989




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

10 söluhæstu lyf 1999 og söluþróun þeirra frá 1989




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Lyfjasölu raðað á skráningarár (útgáfuár markaðsleyfis)



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Lyfjanotkun raðað á skráningarár (útgáfuár markaðsleyfis)



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Greiðslumerkingar almannatrygginga.


***-merkt lyf:** Greiðast að fullu af almannatryggingum.

B-merkt lyf: Sjúkratryggður greiðir fyrst 1000 kr af smásöluverði –40% af verði umfram 1000 kr að hámarki 1800 kr. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiða fyrstu 350 kr af smásöluverði –20% af verði umfram 350 kr að hámarki 600 kr.

E-merkt lyf: Sjúkratryggður greiðir fyrst 1000 kr af smásöluverði –80% af verði umfram 1000 kr að hámarki 3500 kr. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiða fyrstu 350 kr af smásöluverði –40% af verði umfram 350 kr að hámarki 1000 kr.


O-merkt lyf: Almannatryggingar taka ekki þátt í lyfjakostnaði

Skipting lyfjasölu eftir greiðslumerkingum almannatrygginga



Skipting lyfjanotkunar 1999 eftir greiðslumerkingu

(DDD/1000Íbúa/dag)




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Skipting skv. afgreiðslumerkingum. L-merkt =lausasala án lyfseðils, U-merkt= lyfseðilsskyld lyf þar sem sumar minnstu pakkningar má selja án lyfseðils, R-merkt= lyfseðilsskyld lyf


Skipting lyfjanotkunar 1999 (DDD/1000íbúa/dag)

- Lausasölulyf (L merkt)
- Undanþágupakkningar frá lyfseðilssyldu (U merkt)
- Lyfseðilsskyld lyf (R merkt)



Skipting lyfjasölunnar 1999 (M.kr.)


- Lausasölulyf (L merkt)
- Undanþágupakkningar frá lyfseðilssyldu (U merkt)
- Lyfseðilsskyld lyf (R merkt)



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

| | Útsöluverð 1996 | Heildsölув. 1996 | Útsöluverð 1997 | Heildsöluv. 1997 | Útsöluverð 1998 | Heildsöluv. 1998 | Útsöluverð 1999 | Heildsöluv. 1999 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| A Meltingarfæralyf | 761 | 417 | 813 | 449 | 924 | 516 | 1.043 | 590 |
| B Blóðlyf | 293 | 162 | 296 | 168 | 423 | 263 | 507 | 327 |
| C Hjartalyf | 799 | 432 | 856 | 466 | 989 | 549 | 1.089 | 611 |
| D Húðlyf | 372 | 194 | 380 | 200 | 393 | 206 | 395 | 206 |
| G Kvensjúkdómalyf | 529 | 278 | 560 | 296 | 611 | 330 | 689 | 377 |
| H Hormónalyf | 136 | 77 | 136 | 74 | 152 | 85 | 178 | 102 |
| J Sýkingalyf | 623 | 336 | 641 | 348 | 709 | 387 | 738 | 410 |
| L Krabbameinslyf | 205 | 142 | 223 | 154 | 283 | 199 | 404 | 290 |
| M Vöðvalyf | 292 | 148 | 308 | 156 | 355 | 181 | 404 | 206 |
| N Taugalyf | 1.646 | 837 | 1.871 | 950 | 2.227 | 1.160 | 2.510 | 1.316 |
| P Sníklalyf | 34 | 15 | 34 | 15 | 38 | 17 | 38 | 17 |
| R Öndunarfaralyf | 699 | 364 | 757 | 392 | 803 | 422 | 869 | 457 |
| S Skynfæralyf | 163 | 76 | 164 | 76 | 173 | 80 | 167 | 77 |
| V Ýmis lyf | 168 | 96 | 176 | 100 | 181 | 110 | 161 | 95 |
| Samtals | 6.720 | 3.573 | 7.214 | 3.844 | 8.263 | 4.507 | 9.196 | 5.082 |

Skipting lyfjasölu í útsöluverð og heildsöluverð 1996-1999



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Meltingarfæra-og efnaskiptalyf (Alimentary tract and metabolism)

DDD/1000fbúa/dag

| | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A | Meltingarfæra-og efnaskiptalyf (Alimentary tract and metabolism) | 148,89 | 147,05 | 136,44 | 125,80 | 116,73 | 111,02 | 105,28 | 107,62 | 106,91 | 108,57 | 111,45 |
| A01 | Munn-og tannlyf | | | | | | | | | | | |
| A01A | Munn-og tannlyf | 14,34 | 15,96 | 16,33 | 17,14 | 17,06 | 17,10 | 16,40 | 14,85 | 11,32 | 11,81 | 12,11 |
| A02 | Sýrubindandi lyf. Lyf við sársjúkdómi og uppþembu | | | | | | | | | | | |
| A02B | Lyf við sársjúkdómi | 19,07 | 21,37 | 20,48 | 22,81 | 22,34 | 18,92 | 22,07 | 23,52 | 25,12 | 28,13 | 31,90 |
| A02D | Lyf við uppþembu | 0,47 | 0,55 | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,42 | 0,44 | 0,46 |
| A03 | Krampalosandi lyf, andkólínvirk lyf og lyf sem hraða magataemingu | | | | | | | | | | | |
| A03A | Samtengd krampalosandi lyf og andkólínvirk efni | 4,63 | 3,99 | 3,70 | 3,96 | 3,41 | 3,11 | 3,30 | 3,13 | 3,18 | 3,28 | 3,68 |
| A03B | Belladonna og afbrigði, óblönduð lyf | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,20 |
| A03C | Krampalosandi lyf í blöndum með geðlyfjum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A03F | Lyf, sem hraða magataemingu | 1,63 | 1,74 | 1,67 | 1,87 | 1,72 | 1,98 | 1,81 | 2,01 | 1,94 | 2,03 | 2,30 |
| A04 | Lyf við uppköstum og lyf við klígju | | | | | | | | | | | |
| A04A | Lyf við uppköstum og lyf við klígju | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,26 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,39 | 0,43 |
| A06 | Hægðalyf | | | | | | | | | | | |
| A06A | Hægðalyf | 26,88 | 29,37 | 25,92 | 11,08 | 7,34 | 5,09 | 5,75 | 6,06 | 5,47 | 5,29 | 5,12 |
| A07 | Stopplandi lyf; lyf gegn þarmasýkingum og þarmabólginum | | | | | | | | | | | |
| A07A | Þarmasýkingalyf | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,79 | 0,65 | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 0,61 | 0,48 | 0,39 |
| A07D | Lyf, sem draga úr þarmahreyfingum | 0,52 | 0,53 | 0,44 | 0,57 | 0,50 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,77 | 0,99 |
| A07E | Lyf gegn þarmabólginum | 0,85 | 1,11 | 1,13 | 1,27 | 1,34 | 1,43 | 1,68 | 2,04 | 2,27 | 2,44 | 2,57 |
| A08 | Offitulyf, nema fæðuefní | | | | | | | | | | | |
| A08A | Offitulyf, nema fæðuefní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| A09 | Meltingarlyf, þ.á m. hvatar | | | | | | | | | | | |
| A09A | Meltingarlyf, þ.á m. hvatar | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| A10 | Sykursýkilyf | | | | | | | | | | | |
| A10A | Insúlín og insúlínvirk lyf | 2,95 | 2,97 | 3,34 | 2,79 | 3,05 | 3,23 | 3,39 | 3,40 | 3,61 | 4,13 | 4,42 |
| A10B | Sykursýkilyf til inntöku | 4,00 | 4,21 | 4,39 | 5,27 | 5,45 | 5,89 | 6,48 | 6,75 | 7,44 | 8,02 | 8,78 |
| A11 | Vítamín | | | | | | | | | | | |
| A11C | Vítamín A og D, þ. á m. blöndur þeirra | 0,72 | 0,60 | 0,52 | 0,54 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,48 | 0,53 | 0,48 |
| A11D | Vítamín B1; einnig í blöndu með B6 og B12 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| A11E | Vítamín B-komplex, þ.á m. blöndur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11G | Vítamín C, þ.á m. í blöndum | 48,44 | 42,08 | 39,32 | 41,83 | 39,20 | 38,67 | 29,16 | 30,75 | 31,07 | 28,17 | 25,30 |
| A11H | Önnur óblönduð vítamín | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 |
| A11J | Önnur blönduð vítamín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A12 | Málmlyf | | | | | | | | | | | |
| A12A | Kalsíum | 10,59 | 9,27 | 6,54 | 3,46 | 2,65 | 2,37 | 1,94 | 1,91 | 1,90 | 1,58 | 1,18 |
| A12B | Kalíum | 11,94 | 11,38 | 10,35 | 10,73 | 10,02 | 10,09 | 10,22 | 10,02 | 10,35 | 10,47 | 10,27 |
| A14 | Vefaukandi lyf til inntöku eða inndælingar | | | | | | | | | | | |
| A14A | Vefaukandi sterar | 0,15 | 0,22 | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Meltingarfæra-og efnaskiptalyf (Alimentary tract and metabolism)


Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| A | Meltingarfæra-og efnaskiptalyf (Alimentary tract and metabolism) | 691,4 | 761,8 | 778,0 | 781,6 | 737,5 | 722,5 | 766,4 | 760,6 | 812,8 | 924,0 | 1042,7 |
| A01 | Munn-og tannlyf | | | | | | | | | | | |
| A01A | Munn-og tannlyf | 18,6 | 19,0 | 22,1 | 23,0 | 25,7 | 24,9 | 23,3 | 29,9 | 26,1 | 28,5 | 30,5 |
| A02 | Sýrubindandi lyf. Lyf við sársjúkdómi og uppbæmbu | | | | | | | | | | | |
| A02A | Sýrubindandi lyf | 30,1 | 26,5 | 25,9 | 24,7 | 23,4 | 23,8 | 23,7 | 23,0 | 22,1 | 22,7 | 22,3 |
| A02B | Lyf við sársjúkdómi | 338,8 | 392,2 | 399,4 | 431,9 | 385,7 | 352,5 | 390,9 | 375,7 | 412,0 | 486,1 | 570,7 |
| A02D | Lyf við uppbæmbu | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
| A02E | Lyf gegn bakflæði | 8,1 | 7,5 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 6,0 | 6,9 |
| A03 | Krampalosandi lyf, andkólínvirk lyf og lyf sem hraða magataemingu | | | | | | | | | | | |
| A03A | Samtengd krampalosandi lyf og andkólínvirk efni | 26,7 | 21,8 | 21,1 | 21,8 | 19,1 | 17,1 | 17,8 | 18,7 | 19,2 | 20,0 | 23,3 |
| A03B | Belladonna og afbrigði, óblönduð lyf | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 6,9 | 5,6 |
| A03C | Krampalosandi lyf í blöndum með geðlyfjum | 6,2 | 5,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,6 |
| A03F | Lyf, sem hraða magataemingu | 6,7 | 15,5 | 12,9 | 20,3 | 19,4 | 20,9 | 17,9 | 20,0 | 18,8 | 19,9 | 23,3 |
| A04 | Lyf við uppköstum og lyf við klígiu | | | | | | | | | | | |
| A04A | Lyf við uppköstum og lyf við klígiu | 3,2 | 2,8 | 16,4 | 16,2 | 24,8 | 28,2 | 24,9 | 26,7 | 33,0 | 35,0 | 42,5 |
| A06 | Hægðalyf | | | | | | | | | | | |
| A06A | Hægðalyf | 71,7 | 79,6 | 77,2 | 43,0 | 31,9 | 28,6 | 31,2 | 33,5 | 33,5 | 36,0 | 37,6 |
| A07 | Stoppandi lyf; lyf gegn parmasýkingum og parmaþolgum | | | | | | | | | | | |
| A07A | Parmasýkingalyf | 10,3 | 12,4 | 13,4 | 10,8 | 11,5 | 11,1 | 13,0 | 13,0 | 17,6 | 15,4 | 13,5 |
| A07D | Lyf, sem draga úr þarmahreyfingum | 5,9 | 6,4 | 5,4 | 8,0 | 6,7 | 8,2 | 9,0 | 11,0 | 11,2 | 12,5 | 15,6 |
| A07E | Lyf gegn parmaþolgum | 10,1 | 20,2 | 22,4 | 25,9 | 29,4 | 36,3 | 42,4 | 48,2 | 55,6 | 66,9 | 65,9 |
| A07F | Stoppandi örverur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| A08 | Offitulyf, nema fæðuefni | | | | | | | | | | | |
| A08A | Offitulyf, nema fæðuefni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| A09 | Meltingarlyf, þ.á m. hvatar | | | | | | | | | | | |
| A09A | Meltingarlyf, þ.á m. hvatar | 3,2 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | 5,8 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 5,4 | 5,6 | 4,8 |
| A10 | Sykursýkilyf | | | | | | | | | | | |
| A10A | Insúlín og insúlínvirk lyf | 36,3 | 40,8 | 49,7 | 46,2 | 53,6 | 60,3 | 65,2 | 49,8 | 52,7 | 62,2 | 65,7 |
| A10B | Sykursýkilyf til inntöku | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 21,5 | 23,4 | 26,9 | 30,2 | 33,6 | 36,6 | 40,4 | 43,0 |
| A11 | Vítamín | | | | | | | | | | | |
| A11B | Hrein fjölvítamín | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,0 |
| A11C | Vítamín A og D, þ. á m. blöndur þeirra | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 8,7 | 8,3 | 8,9 | 10,1 | 10,2 | 9,5 | 10,1 | 9,3 |
| A11D | Vítamín B1; einnig í blöndu með B6 og B12 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| A11E | Vítamín B-komplex, þ.á m. blöndur | 12,8 | 10,9 | 11,6 | 11,8 | 11,0 | 11,2 | 7,7 | 7,7 | 6,2 | 6,8 | 4,7 |
| A11G | Vítamín C, þ.á m. í blöndum | 12,2 | 10,5 | 11,8 | 12,9 | 12,3 | 11,9 | 8,7 | 8,8 | 8,4 | 7,7 | 6,9 |
| A11H | Önnur óblönduð vítamín | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| A11J | Önnur blönduð vítamín | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A12 | Málmlyf | | | | | | | | | | | |
| A12A | Kalsíum | 39,5 | 34,9 | 21,8 | 12,0 | 9,4 | 8,8 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 6,2 | 4,7 |
| A12B | Kalíum | 10,9 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 10,7 | 11,2 | 11,3 | 11,7 | 13,8 | 14,4 | 14,3 |
| A14 | Vefaukandi lyf til inntöku eða inndælingar | | | | | | | | | | | |
| A14A | Vefaukandi sterar | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999


Meltingarfæra- og efnaskiptalyf

A01 Munn-og tannlyf



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Meltingarfæra- og efnaskiptalyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Blóðlyf (Blood and blood forming organs)

| DDD/1000ífbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B | Blóðlyf (Blood and blood forming organs) | 18,42 | 19,27 | 18,55 | 21,52 | 22,80 | 23,13 | 25,19 | 26,20 | 25,69 | 26,22 | 25,72 |
| B01 | Segavarnalyf | | | | | | | | | | | |
| B01A | Segavarnalyf | 0,63 | 0,54 | 0,57 | 1,25 | 2,10 | 2,68 | 3,62 | 4,12 | 5,01 | 5,64 | 6,12 |
| B02 | Blæðingalyf | | | | | | | | | | | |
| B02A | Segaleysandi efni | 0,34 | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
| B02B | Vítamín K og önnur blæðingalyf | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
| B03 | Blóðskortslyf | | | | | | | | | | | |
| B03A | Járnambönd, þ.a.m. í blöndum | 7,10 | 8,82 | 8,38 | 8,62 | 9,44 | 7,99 | 8,68 | 8,89 | 7,52 | 6,87 | 6,58 |
| B03B | Vítamín B12 og fólínsýra | 10,34 | 9,49 | 9,18 | 11,20 | 10,86 | 12,04 | 12,47 | 12,77 | 12,75 | 13,22 | 12,50 |
| B03X | Önnur blóðskortslyf | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,19 |

Blóðlyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Blóðlyf (Blood and blood forming organs)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| B | Blóðlyf (Blood and blood forming organs) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 162,4 | 204,1 | 206,2 | 232,2 | 243,5 | 269,7 | 258,6 | 293,5 | 296,1 | 423,4 | 507,4 |
| B01 Segavarnalyf | | | | | | | | | | | | |
| B01A | Segavarnalyf | 12,9 | 15,3 | 16,0 | 26,1 | 32,0 | 41,5 | 48,1 | 47,1 | 60,0 | 72,5 | 82,7 |
| B02 Blæðingalyf | | | | | | | | | | | | |
| B02A | Segaleysandi efni | 9,6 | 10,0 | 9,3 | 10,4 | 8,4 | 9,7 | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 9,1 |
| B02B | Vítamín K og önnur blæðingalyf | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 6,6 | 13,1 | 114,6 | 162,1 |
| B03 Blóðskortslyf | | | | | | | | | | | | |
| B03A | Járnksamþönd, þ.á m. í blöndum | 10,2 | 11,6 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 10,0 | 10,3 | 10,8 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
| B03B | Vítamín B12 og fólínsýra | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 7,9 | 7,9 | 8,9 | 8,6 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | 9,2 |
| B03X | Önnur blóðskortslyf | 0,0 | 28,7 | 34,3 | 37,0 | 33,2 | 36,9 | 31,5 | 31,5 | 29,6 | 41,6 | 48,9 |
| B05 Blóðlíki og skolvökvar | | | | | | | | | | | | |
| B05A | Blóð og skyld efni | 18,7 | 30,5 | 23,5 | 19,4 | 19,9 | 27,6 | 17,3 | 16,3 | 13,0 | 9,6 | 11,7 |
| B05B | Innrennslislyf | 71,6 | 67,1 | 64,6 | 80,2 | 88,7 | 104,4 | 102,2 | 124,0 | 117,9 | 119,8 | 118,6 |
| B05C | Skolvökvar | 26,3 | 28,2 | 34,0 | 33,2 | 35,2 | 22,9 | 24,8 | 32,8 | 31,9 | 33,5 | 34,1 |
| B05D | Kviðskilunarvökvar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| B05X | Lyf til upplausnar og/eða þynningar í innrennslislyfjum | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 7,2 | 5,0 | 5,0 | 7,6 | 7,6 | 6,7 |
| B06 Önnur blóðlyf | | | | | | | | | | | | |
| B06A | Önnur blóðlyf | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Blóðlyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Hjarta-og æðasjúkdómalyf (Cardiovascular system)

| DDD/1000fbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C | Hjarta-og æðasjúkdómalyf (Cardiovascular system) | 147,50 | 149,22 | 140,82 | 158,68 | 150,77 | 158,74 | 169,48 | 177,11 | 184,61 | 200,92 | 213,90 |
| C01 | Hjartasjúkdómalyf | | | | | | | | | | | |
| C01A | Hjartaglykósíðar | 6,08 | 6,12 | 5,92 | 5,94 | 5,52 | 5,58 | 5,81 | 5,58 | 5,39 | 5,37 | 5,09 |
| C01B | Lyf við hjartsláttartruflun, flokkar I og III | 1,57 | 1,62 | 1,56 | 1,80 | 1,51 | 1,67 | 1,83 | 2,02 | 2,12 | 2,45 | 2,42 |
| C01C | Hjartaórvandi lyf, önnur en hjatraglykósíðar | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,45 |
| C01D | Æðavíkkandi lyf notuð við hjartasjúkdómum | 12,79 | 13,80 | 13,17 | 13,56 | 13,05 | 13,65 | 14,54 | 14,72 | 15,49 | 16,96 | 17,39 |
| C02 | Blóðþrýstingslækkandi lyf | | | | | | | | | | | |
| C02A | Andadrenvirk lyf með miðlæga verkun | 0,42 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| C02C | Andadrenvirk lyf með útlæga verkun | 0,44 | 0,30 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,36 | 0,70 | 0,95 | 0,84 |
| C02D | Lyf með verkun á sléttu vöðva í slagæðum | 1,13 | 0,82 | 0,64 | 0,51 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
| C03 | Þvagræsilyf | | | | | | | | | | | |
| C03A | Væg þvagræsilyf, tíazíð | 12,08 | 10,38 | 8,92 | 8,63 | 7,58 | 7,70 | 7,88 | 8,17 | 8,12 | 8,25 | 8,31 |
| C03B | Væg þvagræsilyf, önnur en tíazíð | 0,60 | 0,69 | 0,18 | 0,17 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 |
| C03C | Kröftug þvagræsilyf | 16,25 | 17,09 | 16,73 | 19,66 | 18,50 | 19,69 | 20,53 | 20,83 | 21,53 | 23,95 | 21,95 |
| C03D | Kalíumsparandi lyf | 1,49 | 1,36 | 1,28 | 1,46 | 1,43 | 1,44 | 1,54 | 1,49 | 1,53 | 1,73 | 1,68 |
| C03E | Blöndur þvagræsilyfja og K- sparandi lyfja | 28,26 | 26,86 | 24,67 | 26,88 | 25,40 | 25,92 | 26,72 | 27,45 | 27,26 | 27,94 | 27,98 |
| C04 | Æðavíkkandi lyf | | | | | | | | | | | |
| C04A | Æðavíkkandi lyf | 1,00 | 0,81 | 0,64 | 0,68 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,38 | 0,35 | 0,17 | 0,15 |
| C07 | Beta-blokkarar | | | | | | | | | | | |
| C07A | Beta-blokkarar, óblandaðir | 37,98 | 35,67 | 31,89 | 35,22 | 32,44 | 33,30 | 34,26 | 35,03 | 35,85 | 36,83 | 38,11 |
| C07F | Blöndur beta-blokka og annarra blóðþrýstingslækkandi lyfja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C08 | Kalsíumblokkarar | | | | | | | | | | | |
| C08C | Sérhæfðir kalsíumblokkarar með aðalverkun á æðar | 4,58 | 7,36 | 7,95 | 10,02 | 10,54 | 12,67 | 14,02 | 15,88 | 16,82 | 18,77 | 19,65 |
| C08D | Sérhæfðir kalsíumblokkarar með beina verkun á hjartad | 5,13 | 6,07 | 6,41 | 7,43 | 6,97 | 7,25 | 7,22 | 7,04 | 6,55 | 6,59 | 6,34 |
| C09 | Lyf með verkun á reninangiotensín-kerfið | | | | | | | | | | | |
| C09A | ACE-blokkarar, óblandaðir | 14,53 | 16,57 | 16,83 | 22,14 | 23,21 | 24,48 | 26,46 | 26,06 | 25,88 | 25,97 | 26,83 |
| C09C | Angiotensín II blokkarar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 2,13 | 3,62 | 5,80 | 9,21 |
| C09D | Angiotensín II blokkarar í blöndum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,26 | 2,63 |
| C10 | Blóðfitulækkandi lyf | | | | | | | | | | | |
| C10A | Lyf, sem lækka kólesteról og tríglýcerið | 2,78 | 3,07 | 3,18 | 3,78 | 2,94 | 3,77 | 6,21 | 9,14 | 12,53 | 17,20 | 24,58 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Hjarta- og æðasjúkdómalyf



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999


Hjarta-og æðasjúkdómalyf (Cardiovascular system)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| C | Hjarta-og æðasjúkdómalyf (Cardiovascular system) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| C | Hjarta-og æðasjúkdómalyf (Cardiovascular system) | 656,0 | 692,7 | 673,2 | 751,1 | 690,3 | 744,1 | 775,1 | 798,5 | 855,5 | 989,5 | 1089,4 |
| C01 | Hjartasjúkdómalyf | | | | | | | | | | | |
| C01A | Hjartaglykósíðar | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
| C01B | Lyf við hjartsláttartruflun, flokkar I og III | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 22,7 | 21,9 | 24,6 | 26,4 | 27,8 | 28,3 | 32,9 | 31,3 |
| C01C | Hjartaörvandi lyf, önnur en hjatraglykósíðar | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 2,9 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 6,3 | 4,7 | 7,4 | 11,2 |
| C01D | Æðavíkkandi lyf notuð við hjartasjúkdómum | 31,4 | 39,3 | 42,4 | 49,2 | 49,2 | 62,5 | 69,7 | 76,6 | 82,0 | 90,8 | 90,6 |
| C02 | Blóðþrýstingslækkandi lyf | | | | | | | | | | | |
| C02A | Andadrenvirk lyf með miðlæga verkun | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| C02C | Andadrenvirk lyf með útlæga verkun | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 4,2 | 7,8 | 11,0 | 9,4 |
| C02D | Lyf með verkun á sléttu vöðva í slagæðum | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| C03 | Þvagræsilyf | | | | | | | | | | | |
| C03A | Væg þvagræsilyf, tíazíð | 9,6 | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,4 |
| C03B | Væg þvagræsilyf, önnur en tíazíð | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| C03C | Kröftug þvagræsilyf | 21,7 | 21,1 | 20,7 | 21,2 | 20,3 | 22,8 | 24,5 | 26,9 | 26,7 | 30,2 | 26,1 |
| C03D | Kalíumsparandi lyf | 10,5 | 9,1 | 8,4 | 9,1 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 9,6 | 8,7 |
| C03E | Blöndur þvagræsilyfja og K-sparandi lyfja | 47,6 | 40,5 | 38,7 | 36,3 | 28,2 | 27,7 | 16,8 | 16,8 | 15,2 | 15,8 | 15,6 |
| C04 | Æðavíkkandi lyf | | | | | | | | | | | |
| C04A | Æðavíkkandi lyf | 15,9 | 13,2 | 9,4 | 11,2 | 8,5 | 8,3 | 7,7 | 5,6 | 4,9 | 2,1 | 1,6 |
| C05 | Æðaverndandi lyf | | | | | | | | | | | |
| C05A | Gyllinæðarlyf til staðbundinnar verkunar | 16,6 | 17,2 | 17,1 | 18,0 | 18,0 | 18,4 | 19,6 | 22,0 | 20,3 | 20,8 | 21,7 |
| C05B | Æðahnútalyf | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,6 |
| C07 | Beta-blokkarar | | | | | | | | | | | |
| C07A | Beta-blokkarar, óþländaðir | 193,8 | 182,6 | 159,9 | 166,8 | 131,8 | 130,1 | 109,2 | 114,5 | 116,1 | 118,1 | 125,9 |
| C07F | Blöndur beta-blokka og annarra blóðþrýstingslækkandi lyfja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 2,9 |
| C08 | Kalsíumblokkarar | | | | | | | | | | | |
| C08C | Sérhæfðir kalsíumblokkarar með aðalverkun á æðar | 49,6 | 73,5 | 77,7 | 96,2 | 97,9 | 106,1 | 113,8 | 113,0 | 115,4 | 124,2 | 124,4 |
| C08D | Sérhæfðir kalsíumblokkarar með beina verkun á hjartað | 62,2 | 72,9 | 77,0 | 90,1 | 79,5 | 84,1 | 74,7 | 67,7 | 58,9 | 59,3 | 52,8 |
| C09 | Lyf með verkun á renínangótensín-kerfið | | | | | | | | | | | |
| C09A | ACE-blokkarar, óþländaðir | 108,2 | 122,6 | 121,0 | 140,3 | 145,9 | 153,2 | 150,6 | 128,0 | 127,5 | 130,2 | 134,5 |
| C09B | ACE-blokkarar í blöndum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 6,9 | 11,8 | 16,5 | 22,5 |
| C09C | Angiotensín II blokkarar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 23,2 | 38,6 | 62,7 | 90,0 |
| C09D | Angiotensín II blokkarar í blöndum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 13,9 | 26,5 |
| C10 | Blóðfitulækkandi lyf | | | | | | | | | | | |
| C10A | Lyf, sem lækka kólesteról og tríglyceríð | 48,6 | 53,5 | 53,5 | 64,9 | 55,3 | 72,1 | 110,2 | 127,4 | 163,4 | 218,0 | 269,9 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Hjarta- og æðasjúkdómalyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Húðlyf (Dermatologicals)

| DDD/1000fbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| D | Húðlyf (Dermatologicals) | 1,77 | 1,87 | 1,70 | 1,72 | 2,08 | 2,70 | 2,86 | 3,00 | 3,54 | 3,49 | 3,89 |
| D01 | Sveppalyf | | | | | | | | | | | |
| D01B | Sveppalyf til inntöku | 1,53 | 1,31 | 1,10 | 0,94 | 1,29 | 1,64 | 1,75 | 1,77 | 1,93 | 1,95 | 2,36 |
| D05 | Psoriasislyf | | | | | | | | | | | |
| D05B | Psoriasislyf til inntöku | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| D10 | Lyf við bólum | | | | | | | | | | | |
| D10B | Lyf til intöku við bólum | 0,19 | 0,48 | 0,52 | 0,72 | 0,75 | 1,00 | 1,08 | 1,19 | 1,56 | 1,50 | 1,47 |

Húðlyf til inntöku




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Húðlyf (Dermatologicals)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| D | Húðlyf (Dermatologicals) | 195,9 | 216,0 | 226,1 | 263,8 | 310,7 | 363,0 | 372,2 | 372,3 | 380,2 | 393,1 | 394,7 |
| D01 | Sveppalyf | | | | | | | | | | | |
| D01A | Sveppalyf | 20,0 | 32,6 | 39,4 | 48,5 | 58,0 | 62,3 | 63,5 | 68,6 | 62,7 | 61,3 | 60,3 |
| D01B | Sveppalyf til inntöku | 10,9 | 9,5 | 7,7 | 7,0 | 39,2 | 67,4 | 74,8 | 69,0 | 71,9 | 76,2 | 86,2 |
| D02 | Mýkjandi og húðverndandi lyf | | | | | | | | | | | |
| D02A | Mýkjandi og húðverndandi lyf | 2,0 | 1,8 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 3,1 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| D03 | Lyf til meðferðar á sárum | | | | | | | | | | | |
| D03A | Græðandi lyf | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D03B | Hvatar (enzým) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| D04 | Kláða-,ofnæmis- og staðdeyfilyf o.fl. | | | | | | | | | | | |
| D04A | Kláðastillandi lyf, ofnæmislyf, staðdeyfilyf | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| D05 | Psoriasislyf | | | | | | | | | | | |
| D05A | Psoriasislyf til útvortis notkunar | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 9,3 | 16,8 | 24,4 | 22,9 | 20,4 | 20,4 | 21,2 | 21,0 |
| D05B | Psoriasislyf til inntöku | 2,2 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 3,7 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| D06 | Sýklalyf | | | | | | | | | | | |
| D06A | Sýklalyf (antibiotica) | 7,6 | 6,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 9,0 | 9,9 | 10,3 | 10,4 |
| D06B | Sýklalyf (chemotherapeutica) | 13,3 | 16,7 | 15,0 | 17,2 | 16,9 | 10,2 | 13,5 | 15,3 | 20,1 | 22,5 | 24,6 |
| D07 | Barksterar | | | | | | | | | | | |
| D07A | Barksterar, óblönduð lyf | 64,8 | 58,6 | 62,3 | 64,6 | 64,0 | 71,9 | 72,9 | 82,6 | 78,7 | 84,3 | 80,3 |
| D07B | Barksterar og sýklaeyðandi lyf í blöndu | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| D07C | Barksterar og sýklalyf í blöndu | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
| D07X | Barksterar í blöndu með öðrum efnum | 22,9 | 22,1 | 20,3 | 24,7 | 20,9 | 19,3 | 17,9 | 16,1 | 12,9 | 11,8 | 10,7 |
| D08 | Sýklaeyðandi og sýklaheftandi lyf og efni | | | | | | | | | | | |
| D08A | Sýklaeyðandi og sýklaheftandi lyf og efni | 10,0 | 12,2 | 13,9 | 12,8 | 13,5 | 12,3 | 13,5 | 18,2 | 15,2 | 18,3 | 18,5 |
| D09 | Umbúðir | | | | | | | | | | | |
| D09A | Umbúðir | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| D10 | Lyf við bólum | | | | | | | | | | | |
| D10A | Lyf til útvortis notkunar við bólum | 11,0 | 11,4 | 12,7 | 16,3 | 15,8 | 16,7 | 13,5 | 12,4 | 11,0 | 11,6 | 10,6 |
| D10B | Lyf til intöku við bólum | 6,9 | 18,5 | 19,0 | 29,0 | 32,4 | 46,1 | 50,6 | 42,4 | 56,7 | 55,0 | 50,2 |
| D11 | Önnur húðlyf, þ.á m. lyfjasápur | | | | | | | | | | | |
| D11A | Önnur húðlyf, þ.á m. lyfjasápur | 10,4 | 8,5 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 5,3 | 8,3 | 8,4 | 9,4 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Pvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar (Genitourinary system and sex hormones)


| DDD/1000Ífbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| G | Pvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar (Genitourinary system and sex hormones) | 72,44 | 76,90 | 77,19 | 85,02 | 89,42 | 96,37 | 105,10 | 109,30 | 115,90 | 121,66 | 127,75 |
| G01 | Lyf við sýkingum í kynfærum kvenna | | | | | | | | | | | |
| G01A | Lyf við sýkingum í kynfærum kvenna, nema blöndur með barksterum | 1,92 | 1,71 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,47 | 1,54 | 1,46 | 1,29 | 1,13 | 1,06 |
| G02 | Önnur kvensjúkdómalyf | | | | | | | | | | | |
| G02A | Oxýtócfka | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| G02B | Staðvirk getnaðarvarnalyf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G02C | Önnur kvensjúkdómalyf | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| G03 | Kynhormónar og lyf, sem hafa örвandi áhrif á kynfæri | | | | | | | | | | | |
| G03A | Hormónar, notaðir til getnaðarvarna | 45,10 | 45,12 | 46,31 | 48,13 | 48,07 | 49,27 | 51,29 | 50,99 | 53,75 | 56,06 | 56,38 |
| G03B | Andrógen | 1,36 | 1,29 | 1,02 | 1,23 | 1,18 | 1,15 | 1,35 | 1,45 | 1,48 | 1,36 | 1,27 |
| G03C | Östrógen | 6,44 | 7,62 | 8,41 | 10,51 | 12,33 | 15,34 | 18,76 | 22,56 | 24,74 | 26,61 | 26,83 |
| G03D | Prógestógen | 2,17 | 2,36 | 2,39 | 2,62 | 2,69 | 2,67 | 2,94 | 2,85 | 2,93 | 3,70 | 6,71 |
| G03E | Andrógen og kvenkynhormónar í blöndum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G03F | Prógestógen og östrógen í blöndum | 11,46 | 14,73 | 13,77 | 16,65 | 18,82 | 20,87 | 23,36 | 24,38 | 25,65 | 26,70 | 27,06 |
| G03G | Gónadótrópín og önnur lyf með örвandi áhrif á egglos | 1,32 | 1,28 | 1,29 | 1,79 | 1,88 | 1,83 | 1,76 | 1,30 | 1,32 | 1,28 | 1,36 |
| G03H | Andandrógen lyf | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| G03X | Aðrir kynhormónar | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,39 |
| G04 | Pvagfæralyf | | | | | | | | | | | |
| G04A | Sýkingalyf | 1,00 | 0,90 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 0,92 | 0,84 | 0,87 | 0,91 |
| G04B | Önnur þvagfæralyf þ. á m. krampalosandi lyf | 1,23 | 1,27 | 0,98 | 1,05 | 1,09 | 1,21 | 1,24 | 1,19 | 1,32 | 0,92 | 1,60 |
| G04C | Lyf við góðkynja blöðruhálskirtilsstækkun | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,52 | 1,28 | 1,50 | 1,84 | 2,29 | 2,75 | 3,91 |

Pvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Kynhormónar og lyf, sem hafa örвandi áhrif á kynfæri



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999


Pvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar (Genitourinary system and sex hormones)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| G | Pvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar (Genitourinary system and sex hormones) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 190,0 | 219,3 | 226,4 | 275,2 | 320,8 | 406,4 | 476,7 | 528,7 | 560,0 | 610,5 | 689,4 |
| G01 | Lyf við sýkingum í kynfærum kvenna | | | | | | | | | | | |
| G01A | Lyf við sýkingum í kynfærum kvenna, nema blöndur með barksterum | 25,1 | 27,0 | 26,1 | 28,3 | 25,4 | 27,1 | 29,9 | 33,7 | 34,9 | 35,3 | 33,8 |
| G02 | Önnur kvensjúkdómalyf | | | | | | | | | | | |
| G02A | Oxýtócíka | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,1 |
| G02B | Staðvirk getnaðarvarnalyf | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| G02C | Önnur kvensjúkdómalyf | 2,4 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 3,9 |
| G03 | Kynhormónar og lyf, sem hafa örвandi áhrif á kynfæri | | | | | | | | | | | |
| G03A | Hormónar, notaðir til getnaðarvarna | 55,1 | 56,2 | 62,8 | 69,3 | 72,5 | 83,0 | 95,5 | 101,4 | 107,4 | 119,1 | 123,7 |
| G03B | Andrógen | 8,9 | 9,8 | 8,5 | 10,8 | 10,9 | 11,2 | 13,4 | 13,3 | 13,0 | 12,2 | 12,4 |
| G03C | Östrógen | 18,4 | 22,9 | 28,6 | 39,9 | 51,5 | 72,8 | 101,6 | 117,4 | 121,7 | 124,5 | 122,1 |
| G03D | Prógestógen | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 9,1 | 9,6 | 9,4 | 17,5 | 43,2 |
| G03E | Andrógen og kvenkynhormónar í blöndum | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G03F | Prógestógen og östrógen í blöndum | 40,4 | 52,9 | 52,5 | 66,8 | 83,7 | 104,6 | 122,1 | 119,1 | 119,5 | 127,0 | 119,8 |
| G03G | Gónadótrópín og önnur lyf með örвandi áhrif á egglos | 4,8 | 6,6 | 6,8 | 21,2 | 25,3 | 30,3 | 26,7 | 56,6 | 72,4 | 90,0 | 106,7 |
| G03H | Andandrógen lyf | 0,5 | 6,0 | 8,9 | 7,6 | 16,0 | 21,9 | 28,1 | 24,3 | 22,0 | 21,9 | 21,6 |
| G03X | Aðrir kynhormónar | 8,4 | 7,7 | 5,9 | 5,7 | 3,6 | 5,6 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 7,3 |
| G04 | Pvagfæralyf | | | | | | | | | | | |
| G04A | Sýkingalyf | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 5,4 |
| G04B | Önnur þvagfæralyf þ. á m. krampalosandi lyf | 12,9 | 15,3 | 9,5 | 6,8 | 6,7 | 10,0 | 11,7 | 15,1 | 17,7 | 16,1 | 38,4 |
| G04C | Lyf við góðkynja blöðruhálskirtilsstækkun | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 8,6 | 23,0 | 26,8 | 27,7 | 32,5 | 36,5 | 48,9 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Þvagfæralyf, kvensjúkdómalýf og kynhormónar




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Hormónalyf, önnur en kynhormón (Systemic hormonal preparations excluding sex hormones)

| | DDD/1000fbúa/dag | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| H | Hormónalyf, önnur en kynhormón (Systemic hormonal preparations excluding sex hormones) | 16,36 | 17,62 | 17,35 | 18,61 | 18,04 | 19,55 | 20,68 | 21,70 | 23,56 | 25,30 | 30,55 |
| H01 | Hormónar heiladinguls og undirstúku og skyld lyf | | | | | | | | | | | |
| H01A | Hormónar, framhluta heiladinguls og skyld lyf | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| H01B | Hormónar, afturhluta heiladinguls | 0,37 | 0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,73 | 0,78 | 0,72 | 0,73 | 0,93 | 1,05 |
| H01C | Hormónar undirstúku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| H02 | Barksterar | | | | | | | | | | | |
| H02A | Barksterar, óblönduð lyf; einnig til staðbundinnar innstungu | 7,80 | 8,41 | 8,29 | 8,85 | 8,22 | 8,85 | 9,41 | 9,72 | 10,83 | 11,35 | 11,57 |
| H03 | Skjaldkirtilslyf | | | | | | | | | | | |
| H03A | Lyf við vanstarfsemi skjaldkirtils | 7,92 | 8,47 | 8,27 | 9,01 | 8,99 | 9,71 | 10,17 | 10,87 | 11,65 | 12,58 | 17,47 |
| H03B | Lyf við ofstarfsemi skjaldkirtils | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,19 | 0,26 | 0,25 |
| H04 | Briskirtilshormónar | | | | | | | | | | | |
| H04A | Blóðsykurhækkandi lyf | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| H05 | Lyf, sem verka á kalsíumjafnvægi likamans | | | | | | | | | | | |
| H05B | And-paratýróíðhormón | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Hormónalyf, önnur en kynhormón




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Hormónalyf, önnur en kynhormón (Systemic hormonal preparations excluding sex hormones)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| H | Hormónalyf, önnur en kynhormón (Systemic hormonal preparations excluding sex hormones) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 74,0 | 80,1 | 88,0 | 107,4 | 108,8 | 119,4 | 131,2 | 136,5 | 135,7 | 151,7 | 178,3 |
| H01 | Hormónar heiladinguls og undirstíku og skyld lyf | | | | | | | | | | | |
| H01A | Hormónar, framhluta heiladinguls og skyld lyf | 18,4 | 16,6 | 19,5 | 25,7 | 24,8 | 24,3 | 24,3 | 32,5 | 28,8 | 32,7 | 29,8 |
| H01B | Hormónar, afturhluta heiladinguls | 5,2 | 8,5 | 9,5 | 14,6 | 19,2 | 26,4 | 29,6 | 24,0 | 22,5 | 31,4 | 35,5 |
| H01C | Hormónar undirstíku | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 3,3 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 5,6 | 27,3 |
| H02 | Barksterar | | | | | | | | | | | |
| H02A | Barksterar, óblönduð lyf; einnig til staðbundinnar innstungu | 41,8 | 43,6 | 44,7 | 53,1 | 48,9 | 52,1 | 56,5 | 59,2 | 65,4 | 66,7 | 66,7 |
| H03 | Skjaldkirtilslyf | | | | | | | | | | | |
| H03A | Lyf við vanstarfsemi skjaldkirtils | 3,0 | 3,3 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 13,2 |
| H03B | Lyf við ofstarfsemi skjaldkirtils | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| H04 | Briskirtilshormónar | | | | | | | | | | | |
| H04A | Blóðsykurhækkandi lyf | 0,5 | 3,2 | 3,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| H05 | Lyf, sem verka á kalsíumjafnvægi likamans | | | | | | | | | | | |
| H05B | And-paratýróídhormón | 4,9 | 3,4 | 4,2 | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 6,4 | 6,1 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |

Hormónalyf, önnur en kynhormón




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Sýkingalyf (General antiinfectives, systemic)

| DDD/1000fbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| J | Sýkingalyf (General antiinfectives, systemic) | 22,89 | 23,81 | 22,43 | 22,63 | 21,82 | 21,92 | 21,42 | 22,58 | 21,93 | 22,93 | 21,45 |
| J01 | Sýklalyf (antibacterials) | | | | | | | | | | | |
| J01A | Tetracyklínsambönd | 5,65 | 5,47 | 5,18 | 5,74 | 4,96 | 5,24 | 5,16 | 5,35 | 5,34 | 5,42 | 5,15 |
| J01B | Amfeníkólar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J01C | Beta-laktam sýklalyf, penicillín | 10,67 | 11,24 | 10,50 | 9,92 | 10,79 | 10,71 | 10,37 | 10,92 | 10,55 | 11,14 | 10,35 |
| J01D | Önnur beta-laktam sýklalyf | 0,32 | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,58 |
| J01E | Súlfónamíðar og trímetóprím | 2,88 | 2,98 | 3,01 | 3,42 | 3,05 | 2,92 | 2,71 | 2,70 | 2,42 | 2,48 | 2,15 |
| J01F | Makrólíðar og linkósamíðar | 2,48 | 2,25 | 2,11 | 2,09 | 1,68 | 1,58 | 1,52 | 1,88 | 1,73 | 1,80 | 1,70 |
| J01G | Amínoglykósíðar | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| J01M | Kínólónar | 0,43 | 0,71 | 0,54 | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,54 | 0,61 |
| J01X | Önnur sýklalyf | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| J02 | Sveppalyf (antimycotica) | | | | | | | | | | | |
| J02A | Sveppalyf | 0,17 | 0,43 | 0,40 | 0,57 | 0,36 | 0,29 | 0,40 | 0,39 | 0,57 | 0,49 | 0,44 |
| J04 | Lyf gegn Mycobacteriaceae tegundum | | | | | | | | | | | |
| J04A | Berklylaf | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| J05 | Virusýkingalyf | | | | | | | | | | | |
| J05A | Virusýkingalyf með beina verkun á veirur | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,26 |

Sýklalyf J01




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Sýkingalyf (General antiinfectives, systemic)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| J | Sýkingalyf (General antiinfectives, systemic) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 543,7 | 616,0 | 558,9 | 532,7 | 580,3 | 615,1 | 547,4 | 623,1 | 640,8 | 709,5 | 738,3 |
| J01 | Sýklalyf (antibacterials) | | | | | | | | | | | |
| J01A | Tetracyklínsambönd | 49,8 | 50,8 | 44,3 | 45,3 | 42,7 | 42,6 | 40,8 | 44,3 | 41,6 | 42,3 | 43,1 |
| J01B | Amfeníkólar | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| J01C | Beta-laktam sýklalyf, penicillín | 190,3 | 207,0 | 196,2 | 185,7 | 194,2 | 202,0 | 200,3 | 226,5 | 220,5 | 239,9 | 232,3 |
| J01D | Önnur beta-laktam sýklalyf | 66,5 | 78,1 | 73,9 | 76,7 | 91,6 | 102,5 | 68,0 | 62,9 | 75,6 | 74,8 | 69,8 |
| J01E | Súlfónamíðar og trímetóprím | 28,7 | 28,0 | 29,4 | 33,3 | 30,6 | 29,4 | 27,3 | 30,0 | 26,1 | 26,5 | 26,7 |
| J01F | Makrólíðar og linkósamíðar | 57,1 | 49,7 | 44,8 | 45,8 | 39,6 | 35,4 | 29,5 | 42,7 | 42,0 | 51,3 | 45,7 |
| J01G | Amínoglýkósíðar | 13,8 | 11,4 | 9,8 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 7,7 | 8,3 | 7,3 | 6,9 | 6,3 |
| J01M | Kínólónar | 30,4 | 54,8 | 42,4 | 18,8 | 21,5 | 26,7 | 24,3 | 25,8 | 24,4 | 30,2 | 38,8 |
| J01X | Önnur sýklalyf | 46,6 | 31,4 | 35,0 | 20,4 | 21,7 | 36,0 | 25,3 | 29,3 | 22,8 | 21,5 | 24,9 |
| J02 | Sveppalyf (antimycotica) | | | | | | | | | | | |
| J02A | Sveppalyf | 4,4 | 13,9 | 16,1 | 18,8 | 19,2 | 19,9 | 29,7 | 33,2 | 47,2 | 50,2 | 49,2 |
| J04 | Lyf gegn Mycobacteriaceae tegundum | | | | | | | | | | | |
| J04A | Berklyalyf | 4,1 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 3,7 | 4,1 |
| J05 | Veirusýkingalyf | | | | | | | | | | | |
| J05A | Veirusýkingalyf með beina verkun á veirur | 1,4 | 15,9 | 11,3 | 14,4 | 13,2 | 13,1 | 28,4 | 36,5 | 42,8 | 62,2 | 70,1 |
| J06 | Ónæmissermi og immúnóglóbúlin | | | | | | | | | | | |
| J06B | Immúnóglóbúlin | 23,5 | 16,6 | 15,1 | 29,7 | 50,6 | 53,3 | 25,4 | 38,5 | 41,0 | 42,8 | 57,1 |
| J07 | Bóluefní | | | | | | | | | | | |
| J07A | Bakteríubóluefní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 5,1 | 7,2 |
| J07B | Veirubóluefní | 26,5 | 53,2 | 36,6 | 30,8 | 41,7 | 39,7 | 36,9 | 43,0 | 43,6 | 52,0 | 62,9 |

Sýkingalyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Æxlishemjandi lyf (Antineoplastic and immunomodulating agents)

| DDD/1000fbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L | Æxlishemjandi lyf (Antineoplastic and immunomodulating agents) | 1,15 | 1,57 | 1,50 | 1,61 | 1,64 | 1,77 | 2,02 | 2,15 | 2,43 | 2,75 | 3,18 |
| L02 | Lyf með verkun á innkirtla | | | | | | | | | | | |
| L02A | Hormónar og skyld efni | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,59 |
| L02B | And-hormónar og skyld efni | 0,85 | 1,20 | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 0,96 | 1,05 | 1,08 | 1,24 | 1,47 | 1,64 |
| L03 | Ónæmisörvandi lyf | | | | | | | | | | | |
| L03A | Cýtökín og lyf til ónæmistemprunar | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,25 |
| L04 | Lyf til ónæmisbælingar | | | | | | | | | | | |
| L04A | Lyf til ónæmisbælingar | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,70 |

Æxlishemjandi lyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

ÆExlismjandi lyf (Antineoplastic and immunomodulating agents)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| L | ÆExlismjandi lyf (Antineoplastic and immunomodulating agents) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 95,8 | 122,0 | 129,0 | 144,2 | 162,5 | 206,3 | 218,9 | 204,8 | 222,6 | 283,4 | 404,2 |
| L01 | ÆExlismjandi lyf | | | | | | | | | | | |
| L01A | Alkýlerandi efni | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 3,5 | 4,4 |
| L01B | Andmetabólítar | 6,4 | 5,9 | 10,6 | 7,0 | 6,2 | 10,6 | 10,9 | 17,0 | 16,6 | 23,2 | 29,5 |
| L01C | Jurtaalkalóíðar og önnur náttúruefni | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9,1 | 36,7 | 81,5 |
| L01D | Frumueyðandi sýklalyf og skyld efni | 17,3 | 23,4 | 27,2 | 23,9 | 27,0 | 27,3 | 22,7 | 16,4 | 20,0 | 14,4 | 16,8 |
| L01X | Önnur æxlismjandi lyf | 18,0 | 17,8 | 13,8 | 17,2 | 13,9 | 15,7 | 19,7 | 12,6 | 10,6 | 16,1 | 37,4 |
| L02 | Lyf með verkun á innkirtla | | | | | | | | | | | |
| L02A | Hormónar og skyld efni | 5,9 | 8,5 | 12,5 | 16,1 | 20,2 | 23,6 | 33,3 | 34,7 | 38,5 | 43,0 | 46,9 |
| L02B | And-hormónar og skyld efni | 13,2 | 20,7 | 19,2 | 21,7 | 21,2 | 21,6 | 23,5 | 21,3 | 25,9 | 37,9 | 45,7 |
| L03 | Ónæmisörvandi lyf | | | | | | | | | | | |
| L03A | Cytókín og lyf til ónæmistemprunar | 5,2 | 11,1 | 8,1 | 11,0 | 20,6 | 40,8 | 39,2 | 41,2 | 38,8 | 40,9 | 79,5 |
| L04 | Lyf til ónæmisbælingar | | | | | | | | | | | |
| L04A | Lyf til ónæmisbælingar | 26,5 | 31,4 | 34,9 | 44,6 | 50,8 | 63,6 | 66,4 | 57,4 | 61,1 | 67,8 | 62,5 |

ÆExlismjandi lyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf (Musculo-skeletal system)

| DDD/1000fbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| M | Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf (Musculo-skeletal system) | 32,96 | 35,96 | 31,97 | 35,08 | 34,25 | 35,18 | 38,56 | 42,73 | 43,87 | 47,64 | 50,99 |
| M01 | Bólgueyðandi lyf | | | | | | | | | | | |
| M01A | Bólgueyðandi lyf, nema barksterar | 31,09 | 34,14 | 30,46 | 33,34 | 32,64 | 33,47 | 36,68 | 39,78 | 40,49 | 43,84 | 46,76 |
| M01C | Sérhæfð bólgueyðandi lyf | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,15 |
| M03 | Vöðvaslakandi lyf | | | | | | | | | | | |
| M03B | Lyf, sem hafa miðlæg áhrif | 0,76 | 0,61 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,47 |
| M04 | Þvagsýrugigtarlyf | | | | | | | | | | | |
| M04A | Þvagsýrugigtarlyf | 0,78 | 0,85 | 0,77 | 0,97 | 0,92 | 1,03 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,44 | 1,50 |
| M05 | Lyf við sjúkdómum í beinum | | | | | | | | | | | |
| M05B | Lyf, sem hafa áhrif á beinmyndun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,00 | 1,31 | 1,55 | 1,91 |
| M09 | Önnur vöðvasjúkdóma og beinagrindarlyflyf | | | | | | | | | | | |
| M09A | Önnur vöðvasjúkdóma og beinagrindarlyflyf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,20 |

Bólgueyðandi lyf M01




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf (Musculo-skeletal system)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)


| M | Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf (Musculo- skeletal system) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 244,9 | 259,9 | 222,7 | 239,3 | 228,6 | 243,0 | 253,0 | 292,2 | 307,6 | 355,3 | 404,3 |
| M01 | Bólgueyðandi lyf | | | | | | | | | | | |
| M01A | Bólgueyðandi lyf, nema barksterar | 205,3 | 216,6 | 181,9 | 194,4 | 185,8 | 192,9 | 196,1 | 216,5 | 226,2 | 252,3 | 285,6 |
| M01C | Sérhæfð bólgueyðandi lyf | 3,5 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
| M02 | Gigtarlyf til útvortis notkunar | | | | | | | | | | | |
| M02A | Gigtarlyf til útvortis notkunar | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 4,2 | 5,8 | 7,2 |
| M03 | Vöðvaslakandi lyf | | | | | | | | | | | |
| M03A | Lyf, sem hafa útlæg áhrif | 6,6 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 8,9 | 11,2 | 13,8 | 13,4 | 12,3 | 13,8 | 15,9 |
| M03B | Lyf, sem hafa miðlæg áhrif | 22,4 | 22,3 | 19,8 | 21,8 | 21,0 | 21,5 | 21,9 | 18,0 | 11,9 | 13,5 | 12,0 |
| M04 | Þvagsýrugigtarlyf | | | | | | | | | | | |
| M04A | Þvagsýrugigtarlyf | 6,5 | 7,1 | 6,7 | 8,9 | 8,8 | 10,6 | 12,0 | 12,6 | 12,8 | 14,8 | 14,6 |
| M05 | Lyf við sjúkdómum í beinum | | | | | | | | | | | |
| M05B | Lyf, sem hafa áhrif á beinmyndun | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 3,5 | 19,0 | 25,1 | 35,4 | 46,0 |
| M09 | Önnur vöðvasjúkdóma og beinagrindarlyflyf | | | | | | | | | | | |
| M09A | Önnur vöðvasjúkdóma og beinagrindarlyflyf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,8 | 8,1 | 13,1 | 17,8 | 21,4 |

Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Sala bólgueyðandi lyfja, M01A, (1990-1999)




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Tauga- og geðlyf (Central nervous system)

| DDD/1000fbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N | Tauga- og geðlyf (Central nervous system) | 128,61 | 125,73 | 126,58 | 138,75 | 139,32 | 148,37 | 164,76 | 177,68 | 193,05 | 208,07 | 225,53 |
| N02 | Verkjalyf | | | | | | | | | | | |
| N02A | Óptíðar | 0,82 | 1,00 | 0,94 | 2,11 | 3,53 | 5,06 | 6,88 | 9,18 | 11,53 | 12,08 | 15,13 |
| N02B | Önnur verkjalyf og hitalekkandi lyf | 29,41 | 29,13 | 29,42 | 31,00 | 30,76 | 29,03 | 31,49 | 31,49 | 31,38 | 32,16 | 32,11 |
| N02C | Mígrenilyf | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 0,85 |
| N03 | Flogaveikilyf | | | | | | | | | | | |
| N03A | Flogaveikilyf | 6,97 | 7,19 | 6,86 | 7,27 | 6,97 | 7,23 | 7,82 | 8,34 | 8,69 | 8,99 | 8,69 |
| N04 | Lyf við Parkinsonsjúkdómi | | | | | | | | | | | |
| N04A | Andkólínvirk lyf | 2,06 | 2,00 | 1,87 | 1,92 | 1,86 | 1,97 | 2,05 | 1,86 | 1,74 | 1,59 | 1,66 |
| N04B | Dópamínvirk lyf | 1,86 | 1,99 | 2,48 | 2,90 | 2,88 | 3,11 | 3,43 | 3,11 | 3,12 | 3,31 | 3,39 |
| N05 | Geðlyf (psycholeptica) | | | | | | | | | | | |
| N05A | Sterk geðlyf (neuroleptica) | 8,02 | 7,78 | 7,51 | 8,11 | 7,96 | 8,05 | 8,35 | 8,37 | 8,59 | 8,86 | 8,65 |
| N05B | Róandi lyf (anxiolytica) | 23,33 | 19,38 | 21,02 | 22,55 | 21,90 | 22,39 | 22,97 | 23,10 | 23,87 | 24,19 | 24,50 |
| N05C | Svefnlyf (hypnotica og sedativa) | 38,26 | 37,58 | 35,59 | 36,60 | 37,09 | 38,72 | 41,18 | 44,37 | 48,29 | 50,42 | 52,80 |
| N06 | Geðlyf (psychoanaleptica) | | | | | | | | | | | |
| N06A | Geðdeyfðarlyf (antidepressiva) | 14,87 | 16,67 | 16,55 | 18,88 | 19,39 | 25,60 | 33,04 | 38,78 | 44,90 | 53,11 | 59,84 |
| N06B | Örvandi lyf (psychostimulantia) | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,40 | 0,55 | 0,78 | 1,21 | 1,66 |
| N06D | Anti-dementia lyf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,95 |
| N07 | Önnur lyf með verkun á taugakerfið | | | | | | | | | | | |
| N07A | Kólínvirk lyf (parasympatomimética) | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,36 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |
| N07B | Hjálparefni til að hætta reykingum | 1,66 | 1,71 | 3,16 | 6,04 | 5,54 | 5,69 | 5,96 | 7,30 | 8,98 | 10,60 | 12,18 |
| N07C | Lyf við svima | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,24 | 2,96 |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Tauga- og geðlyf



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999


Tauga- og geðlyf (Central nervous system)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| N | Tauga- og geðlyf (Central nervous system) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| N01 | Svæfinga-og deyfingalyf | 640,3 | 715,6 | 792,9 | 993,4 | 1065,0 | 1264,8 | 1463,3 | 1646,3 | 1871,2 | 2227,2 | 2510,3 |
| N01A | Svæfingalyf | 14,4 | 23,2 | 24,0 | 21,6 | 24,9 | 35,5 | 35,2 | 41,2 | 48,5 | 58,6 | 71,0 |
| N01B | Staðdeyfilyf, nema útvortis lyf (sjá flokk D04AB) | 36,4 | 31,2 | 32,1 | 44,3 | 42,6 | 50,1 | 51,9 | 54,5 | 55,9 | 57,4 | 61,2 |
| N02 | Verkjalyf | | | | | | | | | | | |
| N02A | Ópíóíðar | 12,3 | 15,5 | 15,8 | 22,7 | 31,3 | 49,2 | 76,6 | 106,5 | 134,6 | 140,1 | 149,5 |
| N02B | Önnur verkjalyf og hitalækkandi lyf | 105,2 | 108,9 | 149,9 | 165,2 | 182,0 | 184,6 | 209,6 | 240,9 | 247,1 | 268,1 | 292,2 |
| N02C | Mígrenilyf | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 11,6 | 30,5 | 35,1 | 41,2 | 50,2 | 61,6 | 77,3 | 90,9 |
| N03 | Flogaveikilyf | | | | | | | | | | | |
| N03A | Flogaveikilyf | 50,0 | 54,0 | 52,9 | 64,6 | 74,0 | 83,3 | 97,2 | 111,1 | 128,5 | 150,3 | 150,7 |
| N04 | Lyf við Parkinsonsjúkdómi | | | | | | | | | | | |
| N04A | Andkólínvirk lyf | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
| N04B | Dópamínvirk lyf | 54,3 | 77,7 | 70,7 | 82,1 | 74,3 | 84,2 | 76,1 | 63,0 | 66,2 | 85,6 | 82,5 |
| N05 | Geðlyf (psycholeptica) | | | | | | | | | | | |
| N05A | Sterk geðlyf (neuroleptica) | 59,7 | 60,4 | 60,4 | 73,8 | 83,6 | 90,2 | 112,2 | 117,5 | 120,9 | 158,1 | 184,2 |
| N05B | Róandi lyf (anxiolytica) | 55,2 | 52,8 | 62,3 | 66,5 | 70,9 | 74,5 | 75,9 | 84,3 | 86,6 | 91,2 | 91,5 |
| N05C | Svefnlyf (hypnotica og sedativa) | 87,8 | 87,5 | 83,6 | 85,6 | 88,2 | 88,9 | 90,1 | 102,5 | 113,0 | 124,6 | 134,9 |
| N06 | Geðlyf (psychoanaleptica) | | | | | | | | | | | |
| N06A | Geðdeyfðarlyf (antidepressiva) | 117,4 | 155,3 | 161,4 | 197,9 | 222,6 | 334,7 | 422,4 | 468,1 | 558,3 | 699,8 | 792,6 |
| N06B | Örvandi lyf (psychostimulantia) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 4,4 | 7,1 | 9,4 |
| N06D | Anti-dementia lyf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 39,9 |
| N07 | Önnur lyf með verkun á taugakerfið | | | | | | | | | | | |
| N07A | Kólínvirk lyf (parasympatomimetica) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| N07B | Hjálparefni til að hætta reykingu | 34,5 | 36,0 | 66,7 | 150,5 | 132,0 | 146,0 | 165,9 | 196,2 | 238,7 | 284,7 | 322,1 |
| N07C | Lyf við svima | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 28,5 |
| N07X | Önnur lyf, sem verka á taugakerfið | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 4,8 | |

Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Tauga- og geðlyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Sníklalyf (Antiparasitica)

DDD/1000 íbúa/dag

| | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P | Sníklalyf (Antiparasitica) | 1,32 | 1,15 | 1,22 | 1,33 | 1,42 | 1,40 | 1,41 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| P01 | Lyf gegn frumdýrum (antiprotozoals) | | | | | | | | | | | |
| P01A | Amöbulyf og lyf gegn öðrum frumdýrum | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 |
| P01B | Malaríulyf | 1,06 | 0,88 | 0,97 | 1,04 | 1,15 | 1,09 | 1,10 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 1,19 |
| P02 | Ormalýf (anthelmintica) | | | | | | | | | | | |
| P02C | Lyf gegn práðormum (antinematodals) | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |

Sníklalyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Sníklalyf (Antiparasitica)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P | Sníklalyf (Antiparasitica) | 15,8 | 18,2 | 18,3 | 19,8 | 21,4 | 25,4 | 28,4 | 33,8 | 34,1 | 38,0 | 38,4 |
| P01 | Lyf gegn frumdýrum (antiprotozoals) | | | | | | | | | | | |
| P01A | Amöbulyf og lyf gegn öðrum frumdýrum | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 5,7 | 7,3 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 8,3 | 7,7 |
| P01B | Malarfulyf | | 5,5 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 10,1 | 11,6 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 14,4 |
| P01C | Lyf gegn sjúkdómum af völdum leishmaniasis og trypanosomiasis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| P02 | Ormalyf (anthelmintica) | | | | | | | | | | | |
| P02C | Lyf gegn þráðormum (antinematodals) | | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 6,4 | 5,4 | 5,4 |
| P03 | Lyf gegn útvortis sníkjudýrum, þ.á m.kláðamaurum og skordýraeitur og skordýrafælur | | | | | | | | | | | |
| P03A | Lyf gegn útvortis sníkjudýrum, þ.á m.kláðamaurum | 2,9 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 6,1 | 8,0 | 9,5 | 10,3 |

Sníklalyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Öndunarfæralyf (Respiratory system)

| | DDD/1000fbúa/dag | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| R Öndunarfæralyf (Respiratory system) | 60,94 | 67,10 | 70,30 | 74,06 | 68,97 | 74,66 | 81,58 | 87,29 | 88,53 | 91,67 | 94,29 | |
| R01 Neflyf | | | | | | | | | | | | |
| R01A Lyf við nefstíflu og önnur neflyf til staðverkunar | 9,25 | 9,81 | 11,66 | 12,33 | 12,98 | 14,48 | 16,72 | 18,50 | 19,86 | 19,99 | 21,30 | |
| R01B Neflyf, ætluð til inntöku | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | |
| R03 Astmalyf | | | | | | | | | | | | |
| R03A Adrenvirk lyf til innúðunar | 16,81 | 19,70 | 19,89 | 21,11 | 18,88 | 19,41 | 20,35 | 21,19 | 21,10 | 21,70 | 21,55 | |
| R03B Önnur astmalyf til innúðunar | 7,57 | 10,15 | 11,64 | 14,13 | 12,98 | 16,04 | 18,59 | 19,66 | 20,45 | 22,24 | 23,13 | |
| R03C Adrenvirk lyf til inntöku eða innstungu | 1,54 | 1,40 | 1,41 | 1,14 | 0,79 | 0,69 | 0,60 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,24 | |
| R03D Önnur astmalyf til inntöku eða innstungu | 9,81 | 8,38 | 7,16 | 6,95 | 5,28 | 4,69 | 4,29 | 3,75 | 3,45 | 3,28 | 3,55 | |
| R05 Hósta-og kveflyf | | | | | | | | | | | | |
| R05C Slímlosandi lyf, nema blöndur með hóstastillandi lyfjum | 0,63 | 0,58 | 0,51 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,54 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | |
| R05D Hóstastillandi lyf, nema blöndur með slímlosandi lyfjum | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,37 | 0,48 | |
| R05F Hóstastillandi og slímlosandi lyf í blöndum | 1,37 | 1,10 | 1,20 | 1,14 | 1,19 | 1,03 | 1,16 | 1,29 | 1,23 | 1,44 | 1,36 | |
| R06 Ofnæmislyf til inntöku eða innstungu | | | | | | | | | | | | |
| R06A Ofnæmislyf til inntöku eða innstungu | 13,07 | 15,11 | 15,95 | 16,12 | 15,78 | 17,24 | 18,72 | 21,19 | 20,81 | 21,17 | 21,44 | |

Öndunarfæralyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Öndunarfæralyf (Respiratory system)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| R | Öndunarfæralyf (Respiratory system) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 301,7 | 345,3 | 392,9 | 424,4 | 425,3 | 514,9 | 605,8 | 699,1 | 757,1 | 803,2 | 869,3 |
| R01 Neflyf | | | | | | | | | | | | |
| R01A | Lyf við nefstíflu og önnur neflyf til staðverkunar | 41,2 | 44,9 | 55,8 | 59,7 | 64,4 | 81,5 | 101,7 | 121,0 | 131,8 | 137,7 | 150,6 |
| R01B | Neflyf, ætluð til inntöku | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 5,5 |
| R02 Hálslyf | | | | | | | | | | | | |
| R02A | Hálslyf | 10,0 | 8,4 | 12,2 | 13,0 | 11,8 | 11,8 | 13,7 | 14,9 | 17,4 | 18,8 | 18,9 |
| R03 Astmalyf | | | | | | | | | | | | |
| R03A | Adrenvirk lyf til innúðunar | 58,1 | 73,5 | 74,9 | 85,5 | 91,1 | 114,2 | 125,9 | 150,3 | 164,5 | 179,2 | 198,3 |
| R03B | Önnur astmalyf til innúðunar | 73,4 | 101,3 | 116,0 | 131,2 | 127,6 | 175,4 | 217,7 | 244,0 | 266,2 | 286,1 | 305,6 |
| R03C | Adrenvirk lyf til inntöku eða innstungu | 9,9 | 8,8 | 9,3 | 7,8 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 2,9 |
| R03D | Önnur astmalyf til inntöku eða innstungu | 29,4 | 25,2 | 22,7 | 21,8 | 14,2 | 12,9 | 12,5 | 13,2 | 12,1 | 18,0 | 26,5 |
| R05 Hósta-og kveflyf | | | | | | | | | | | | |
| R05C | Slímlosandi lyf, nema blöndur með hóstastillandi lyfjum | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 5,5 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 6,4 | 9,6 | 11,8 | 12,4 |
| R05D | Hóstastillandi lyf, nema blöndur með slímlosandi lyfjum | 17,2 | 14,5 | 20,0 | 19,8 | 21,4 | 18,9 | 23,2 | 31,1 | 31,0 | 27,9 | 29,3 |
| R05F | Hóstastillandi og slímlosandi lyf í blöndum | 8,2 | 6,7 | 8,9 | 8,6 | 9,6 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 12,4 | 14,6 | 13,9 |
| R06 Ofnæmislyf til inntöku eða innstungu | | | | | | | | | | | | |
| R06A | Ofnæmislyf til inntöku eða innstungu | 43,6 | 52,6 | 63,1 | 68,4 | 71,0 | 77,2 | 82,7 | 93,3 | 90,5 | 95,6 | 97,3 |
| R07 Önnur öndunarfæralyf | | | | | | | | | | | | |
| R07A | Önnur öndunarfæralyf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 5,8 | 13,6 | 5,2 | 8,1 |

Öndunarfæralyf




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Augn-og eyrnalyf (Sensory organs)

| DDD/1000íbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| S | Augn-og eyrnalyf (Sensory organs) | 11,27 | 10,46 | 9,07 | 9,68 | 9,85 | 9,75 | 9,75 | 10,02 | 10,26 | 10,28 | 9,09 |
| S01 | Augnlyf | | | | | | | | | | | |
| S01E | Gláku-og ljósopsþrengjandi lyf | 11,27 | 10,46 | 9,07 | 9,68 | 9,85 | 9,75 | 9,75 | 10,02 | 10,26 | 10,28 | 9,09 |

Augnlyf, S01




Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Augn-og eyrnalyf (Sensory organs)

Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk)

| S | Augn-og eyrnalyf (Sensory organs) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 87,8 | 107,2 | 112,6 | 114,4 | 126,9 | 134,3 | 140,8 | 162,9 | 164,2 | 173,2 | 167,4 |
| S01 Augnlyf | | | | | | | | | | | | |
| S01A | Sýkingalyf (antiinfectiva) | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 12,0 | 12,3 | 13,5 | 14,1 | 16,8 | 15,9 | 15,8 | 14,5 |
| S01B | Bólgyeýðandi lyf | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,4 | 5,9 |
| S01C | Bólgyeýðandi lyf og sýkingalyf í blöndum | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| S01D | Önnur augnlyf | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S01E | Gláku-og ljósopsþrengjandi lyf | 45,2 | 49,9 | 53,0 | 57,6 | 64,2 | 66,0 | 70,4 | 80,3 | 84,3 | 84,3 | 81,9 |
| S01F | Ljósopsvíkkandi lyf | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| S01G | Ofnæmisylyf | 7,0 | 8,5 | 11,2 | 8,4 | 9,2 | 10,7 | 10,1 | 15,3 | 11,8 | 13,6 | 13,2 |
| S01H | Staðdeyfilyf | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| S01K | Hjálparlyf við skurðaðgerðir | 0,0 | 9,2 | 8,3 | 6,8 | 7,6 | 7,1 | 7,3 | 5,6 | 6,6 | 8,8 | 8,1 |
| S01X | Önnur augnlyf | 4,3 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 9,8 | 10,4 | 12,9 | 13,1 |
| S02 Eyrnalyf | | | | | | | | | | | | |
| S02A | Sýkingalyf | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| S02C | Barksterar og sýkingalyf í blöndum | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 2,3 |
| S02D | Önnur eyrnalyf | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| S03 Augn-og eyrnalyf, blönduð lyf | | | | | | | | | | | | |
| S03B | Barksterar | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| S03C | Barksterar og sýkingalyf í blöndum | 11,9 | 14,1 | 14,0 | 14,8 | 15,4 | 17,7 | 18,3 | 21,9 | 20,6 | 21,5 | 20,2 |

Augn- og eyrnalyf



Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999

Ýmis lyf (Various)

| DDD/1000fbúa/dag | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| V | Ýmis lyf (Various) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| V03 | Önnur lyf, ýmis konar | | | | | | | | | | | |
| V03A | Önnur lyf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Lyfjasala í milljónum króna á verðlagi hvers árs (útsöluverð með vsk) | | | | | | | | | | | | |
| V | Ýmis lyf (Various) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| V01 | Ofnæmisvakar | 105,0 | 124,3 | 129,3 | 142,4 | 165,8 | 181,8 | 174,1 | 167,7 | 176,2 | 180,9 | 161,4 |
| V01A | Ofnæmisvakar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| V03 | Önnur lyf, ýmis konar | 5,9 | 5,5 | 6,8 | 7,8 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 12,8 |
| V04 | Sjúkdómsgreiningarefni | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| V06 | Næringerlyf | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| V06D | Önnur næringarlyf | 47,8 | 55,1 | 61,4 | 68,5 | 71,9 | 65,1 | 58,3 | 60,4 | 60,5 | 59,3 | 64,0 |
| V07 | Ýmis óvirk efni | 47,7 | 61,2 | 58,2 | 63,7 | 79,6 | 100,7 | 99,0 | 90,9 | 98,8 | 104,9 | 73,2 |
| V08 | Skuggaefni | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 4,3 | 6,3 | 6,9 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 9,3 |
| V08A | Röntgenskuggaefni, sem innihalda joð | | | | | | | | | | | |
| V08B | Röntgenskuggaefni, sem innihalda ekki joð | | | | | | | | | | | |

Ýmis lyf

